

Smitteforebyggende tiltak på fødeavdelingen

Sist oppdatert:

Gry Findal, Gynekolog, Drammen sykehus uxfigr@vestreviken.no

Torleiv Kvalvik, infeksjonsmedisiner, Haukeland

Hafsa Ahmed, SUS/København, lis i gyn.obst, hafsa_ahmed95@hotmail.com

Randi Mette Steen, gynekolog Førde, randimette@gmail.com

Dorthea Hagen Oma, Smittevernsoverlege Haugeland, dorthea.hagen.oma@helse-bergen.no

Generelt

Spredning av infeksjon kan skje under svangerskapet eller ved fødsler; fra mor til nyfødt, fra mor/nyfødt til andre barselkvinner, nyfødte eller til personalet. Tiltak og forholdsregler vil i stor grad avhenge av type infeksjon, mikrobe og lokale forhold.

For spesifikke råd henstilles det til de aktuelle mikrobe-avsnittene i veileder for fødselshjelp ([Metodebok](#)) og smittevernshåndboka til FHI ([Smittevernshåndboka - FHI](#)). Hvert enkelt sykehus/helseforetak vil også ha grundige prosedyrer for infeksjonsforebygging, smittevern og håndtering av pasienter kolonisert med antibiotikaresistente bakterier” som det enkelte helsepersonell bør sette seg inn i.

Endringslogg

Dette kapittelet er nærmest fjernet da gruppen ser at informasjonen er foreldet og da vi tror det er mer hensiktsmessig å vise til lokalt smittevern. FHI (smittevernshåndboka) og de aktuelle mikrobekapitlene i veilederen. Vi foreslår derfor å kutte det meste av dette kapittelet.