

Trandateinfusjon - flytskjema

Flytskjema for Trandate® / Labetalol

Behandlingsindikasjon:

Diastolisk blodtrykk ≥ 115 mm Hg eller behandlingsmål ikke oppnådd ved oral behandling.

Kan startes ved lavere BT dersom uttalte subjektive symptomer.

Nifedipin 10 mg p.o./sublingualt bør forsøkes før oppstart trandateinfusjon

Blodtrykksmåling:

- Høyre overarm
- Overarm ≥ 32 cm; bred mansjett
- Måling gjøres i hjertenivå



Starte med bolusdose Trandate®:

20 mg (=4 ml) gis langsomt i.v. (over minst 2 minutter)

- Pasienten skal ligge under infusjonen
- Kontinuerlig CTG- registrering
- Blodtrykkskontroll hvert 5. minutt




Dårlig respons? (Diastolisk BT ≥ 110 mm Hg)



Øk dosen til Trandate® 50 mg (=10ml) gis langsomt i.v. (over minst 2 min). Gjentas hvert 5. minutt dersom dårlig respons.

God respons?

Diastolisk BT < 110 mmHg



Start Trandate®-infusjon.
Se framgangsmåte under



Dårlig respons? (BT ≥ 110 mm Hg)



Gjenta bolusdose med Trandate 50 mg i.v.



Maksimal kumulativ bolusdose Trandate®/Labetalol er 200 mg i.v. Dersom fortsatt dårlig respons: Kontakt vakthavende anesthesi.

BT – ktr. hvert 15. minutt

Dårlig respons?

Infusjonshastigheten økes med 20 ml/time hvert 30. min. inntil adekvat respons.



Maksimal infusjonshastighet 160 ml/t (= 160 mg/t)

God respons?

Kontinuer infusjonen eller nedtrapping/seponer ved oppnådd behandlingsmål:
Systolisk BT < 150
Diastolisk BT 80-100

Kontinuerlig infusjon: Labetalol 200mg i NaCl 9mg/ml 160ml

Labetalol 200 mg (Labetalol 5 mg/ml - 2 amp á 20 ml) tilsettes i NaCl 9mg/ml 160 ml. (= 1mg/ml)

Startinfusjonshastigheten 20 ml/time (20 mg/time), økes med 10-20 ml/time ca. hvert 20-30 minutt inntil tilfredsstillende blodtrykk oppnås. Maks infusjonshastighet 160 ml/time.

Koble pasienten til skop så raskt som mulig. Når pasient er registrert på skopet, overføres målinger til kurve i Metavision.

Vitale mål:

Kl.	BT:	Puls:

Referanser[A3.2/3.1.2-38](#)[Hypertensive svangerskapssykdommer, preeklampsi, eklampsi, Mg-infusjon og HELLP](#)[Veileder i fødselshjelp. Norsk gynekologisk forening](#)

•

Vedlegg**Slutt på Prosedyre**